

Dôležité upozornenia

Vylúčte dočinenie je pre Vaše dieťa to najlepšie v prvých šiestich mesiacoch. Pokiaľ budete chcieť použiť HiPP HA2 dojčenskú výživu, poraďte sa prosím s lekárom alebo osobou kvalifikovanou v oblasti výživy, farmácie alebo starostlivosti o matku a dieťa. HiPP HA2 Combiotik® je dietetická potravina na osobitné medicínske účely pre deti ohrozené alergiou v dojčenskom veku a môže byť podávaný len na odporúčanie lekára a pod lekársym dohľadom od ukončeného 6. mesiaca (dietetická potravina na osobitné medicínske účely). Ako každá následná dojčenská výživa by sa nemal ani HiPP HA2 Combiotik® používať v prvých šiestich mesiacoch ako náhrada materského mlieka, ale zásadne až po šiestich mesiacoch ako súčasť zmiešanej stravy. HiPP HA2 Combiotik® nie je vhodný pre deti ohrozené alergiami - HiPP HA2 Combiotik® nepoužívajte pri alergií na kravské mlieko ani pri podozrení na vznik alergie. Poradte sa so svojim lekárom. Rovnako ako materské mlieko, obsahujú tiež dojčenskú výživu sacharidy, ktoré sú dôležitou súčasťou výživy detí. Častý alebo trvalý kontakt zubov s tekutinou obsahujúcou sacharidy, môže spôsobiť vznik zubného kazu a s tým súvisiace zdravotné problémy. Krmte preto svoje dieťa plynu, nenechávajte ho z fľaše dlho piť a naučte ho čo najskôr piť z pohára. Výrobok nesmie byť konzumovaný dojčatami, ktoré sú alergické na mliečne bielkoviny. Nevhodné k parenterálnemu užívaniu.

Zloženie

Laktóza, rastlinné oleje (palmový olej*, repkový olej, slnečnicový olej), škrob, **hydrolyzovaná bielkovina mliečnej srvátky**, vláknina (galaktooligosacharidy z **laktózy**), vápenaté soli kyseliny orthofosforečnej, chlorid draselný, emulgátor – estery mono - a diglyceridov mastných kyselín s kyselinou citrónovou, L-tyrosín, hydroxid draselný, hydroxid sodný, vápenaté soli kyseliny citrónovej, vitamín C, uhličitan horečnatý, draselné soli kyseliny citrónovej, síran horečnatý, L-tryptofán, uhličitan vápenatý, síran železnatý, síran zinočnatý, prírodné kultúry mliečného kvasenia (Lactobacillus fermentum hereditum¹⁾), kyselina pantothenová, vitamín A, niacín, síran mednatý, vitamín E, vitamín B1, vitamín B2, vitamín B6, jodid draselný, kyselina listová, vitamín K, selenan sodný, biotín, vitamín D, vitamín B12. BEZGLUTÉNOVÝ (podľa zákona). 1) Lactobacillus fermentum CECT5716 *palmový olej z trvalo udržateľného poľnohospodárstva - certifikované nezávislými kontrolnými orgánmi. Výrobok je vyrobený zo surovín prírodných farebných variácií.

Návod na prípravu

Je dôležité dodržiavať návod na prípravu, podmienky uchovania, skladovania a zaobchádzania s výrobkom, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia dieťaťa. Dodržiavajte presne tento návod na prípravu dojčenskej výživy ako aj uvedené odporúčania. Nesprávna príprava alebo uchovávanie pripravenej fľašky by mohlo viesť k ohrozeniu zdravia Vášho dieťaťa. Preto pripravujte výživu pred každým kŕmením čerstvú. Zostatky opakovane nepoužívajte. Fľašku a všetky jej súčasti vždy starostlivo umyte. Otvorený obal ihneď po odobratí výrobku dobre uzatvorte, uchovávajte v suchu a pri teplote max. +25 °C a zamedzte kolísaniu teplôt. Od prvého otvorenia spotrebujte do 3 týždňov.

Nezohrievajte výživu v mikrovlnnej rúre (nebezpečenstvo popálenia).

Pitnú vodu pred každou prípravou čerstvo prevaríme a necháme vychladnúť na teplotu cca 40 až 50 °C.*

2/3 pripravenej vody nalejeme do fľašky.

Odmerku naplníme výrobkom a opačnou stranou noža zarovnáme. Odmerané množstvo výrobku pridáme do fľašky.



Fľašku uzavrieme a dôkladne pretrepeme.

Pridáme zvyšok vody a opäť niekoľkokrát dôkladne pretrepeme.

Ochladíme na teplotu, vhodnú na pitie (cca 37 °C). Teplotu overíme.

*Aby nedošlo k poškodeniu prírodných kultúr mliečného kvasenia (Laktobacily), nezalievajte výrobok vriacou vodou.

Množstvo nápoja a dávkovanie

Množstvo nápoja na fľašu môže byť rozdielne na základe individuálnych potrieb*. Odporúčané množstvo nápoja a počet fliaš na deň sú iba orientačné. **Používajte prosím priložený odmerku!**

Množstvo pripravenej výživy (ml)*	Na jednu dávku potrebujete	
	Množstvo prevarenej pitnej vody (ml)	Počet odmeriek
170	150	5
200	180	6
235	210	7

1 odmerka prášku = 30 ml prevarenej pitnej vody.

*Pokiaľ lekár nestanoví inak, dojčatá potrebujú cca 5 jedál za deň. S každým novo pridaným príkrmom v skle alebo kašou odpadá jedno jedlo vo fľaške.