

## **KLINICKÝ PROTOKOL** **indikácií testovania metódou RT-PCR na dôkaz SARS-CoV-2 (verzia 11)**

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva nasledovné úpravy k indikáciám na odber vzoriek výterov z orofaryngu a nazofaryngu za účelom RT-PCR diagnostiky suspektných alebo pozitívnych osôb v súvislosti s ochorením COVID-19:

Odbery vzoriek na vyšetrenie RT-PCR metódou na stanovenie prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 sa vykonávajú u dospelých z orofaryngu aj nazofaryngu. U detí sa vykonáva odber vzorky na stanovenie prítomnosti vírusu kloktaním, v nevyhnutnom prípade je možné odber realizovať sterom z orofaryngu.

### **Pacient indikovaný na vyšetrenie na základe klinických príznakov**

- Pacient (dospelý alebo dieťa) s akútnou infekciou dýchacích ciest - náhly nástup aspoň jedného z nasledujúcich symptómov: **kašeľ, dýchavičnosť, telesná teplota nad 38 °C** po dobu 3 a viac dní bez inej etiológie, ktorá plne vysvetľuje klinický obraz, resp. ak nie je známa epidemiologická anamnéza napr. anamnéza cestovania alebo pobytu v krajine/oblasti s lokálnym prenosom alebo prenosom v komunite, počas 14 dní pred objavením sa symptómov alebo pri skupinách, ktoré majú výnimku prechodu cez štátne hranice na územie Slovenskej republiky (napr. nákladná, lodná doprava).
- Pacient (dospelý alebo dieťa) s miernymi príznakmi respiračného ochorenia (bolesti hrdla, bolesť ucha, upchatý nos) po zvážení epidemiologického rizika ošetrojúcim lekárom.
- Pacient s náhle vzniknutou poruchou čuchu alebo chuti.
- Pacient s akútnym respiračným ochorením, ktorý bol v posledných 14 dňoch pred objavením sa symptómov **v úzkom kontakte s potvrdeným** na ochorenie COVID-19.
- Klienti v zariadeniach sociálnych služieb alebo z MRK (marginalizovaných rómskych komunít) s respiračnou infekciou (na základe indikácie všeobecného lekára, infektológa, epidemiológa alebo hygienika).
- Tehotná pacientka, ktorá prišla na pôrod akútne a má príznaky respiračnej infekcie alebo prišla do kontaktu s potvrdeným (v posledných 14 dňoch) alebo s pravdepodobným prípadom na ochorenie COVID-19 (v procese vyšetrenia RT-PCR).

- Pacient pred akútnym operačným intervenčným výkonom v celkovej anestézii s respiračnou infekciou a/alebo známym úzkym kontaktom alebo z karantény pre ochorenie COVID-19.
- Pacient na OAIM (oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny) a JIS (jednotka intenzívnej starostlivosti) pri náhlom vývoji respiračnej insuficiencie s nejasnou etiológiou.
- Pacient, ktorého zdravotný stav si vyžaduje hospitalizáciu so SARI (ťažká akútna respiračná infekcia) a bez ďalšej etiológie, ktorá by jednoznačne vysvetľovala klinický obraz.

### **Pacient indikovaný na vyšetrenie na základe epidemiologických a iných kritérií**

- Pred nástupom detí do prevádzok zotavovacích zariadení podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Úzke kontakty s osobou s potvrdenou infekciou na ochorenie COVID-19 (odobrať výter sa odporúča na 5. až 10. deň od posledného kontaktu).
- Je možné zvážiť vyšetrenie exponovaného zdravotníckeho pracovníka a pracovníka, ktorý pracuje v karanténnom centre (napr. MVSR pri repatriácii, s ľuďmi bez domova), MO SR, OZ SR pri práci s rizikovými skupinami (pre túto skupinu je možné v rámci skríningu stanoviť protilátky proti SARS-CoV-2 (imunoanalýza, RDT test a pri náleze protilátok proti SARS-CoV-2 následne vykonať RT-PCR SARS-CoV-2).
- Psychiatrický pacient, u ktorého nie je možné odobrať spoľahlivú objektívnu anamnézu alebo s nízkou úrovňou dodržiavania epidemiologických štandardov.
- Klienti a zamestnanci v ZSS (zariadeniach sociálnych služieb) a CDR (centrá pre deti a rodinu), v denných stacionároch alebo z MRK pri reaktívnom RDT na ochorenie COVID-19.
- Traumatické stavy so zmenou vedomia a neurčité stavy na základe indikácie lekára.
- Test pred odberom orgánu od darcu za účelom transplantácie.
- Pacient pri prijíme do nemocnice alebo počas hospitalizácie, ktorý má alebo sa mu v priebehu hospitalizácie vyvinie respiračná infekcia, nejasné febrility alebo z epidemiologických dôvodov z rozhodnutia lekára, RÚVZ alebo nemocničného epidemiológa (vyšetrenie metódou RT-PCR).

- Pred plánovaným operačným zákrokom pri prijatí na hospitalizáciu na základe indikácie operátora (alebo nemocničného epidemiológa) pri nepriaznivej lokálnej epidemiologickej situácii (v súlade s Pandemickým plánom pre prípad pandémie v Slovenskej republike) alebo ak to odôvodňuje stav pacienta alebo charakter operačného zákroku.

**Schválené:** Konziliom epidemiológov, verejných zdravotníkov a infektológov ÚV SR a MZ SR, NRC pre chrípku, ministrom zdravotníctva MUDr. Vladimírom Lengvarským, MPH a Hlavným hygienikom SR MUDr. RNDr. Mgr. Jánom Mikasom, PhD., MPH

Tento klinický diagnostický postup nadobúda účinnosť 25.6.2021.

**Vladimír Lengvarský, v.r.**  
minister zdravotníctva